


Corrigé du devoir maison 6.

Partie 1 : définition géométrique du nombre d'or

1°) On note L' et ℓ' la longueur et la largeur du 2e rectangle.

Les mesures des côtés de ce rectangle sont ℓ et $L - \ell$.

Or $\ell > \frac{L}{2}$ donc $-\ell < -\frac{L}{2}$ d'où $L - \ell < \frac{L}{2}$ d'où $L - \ell < \ell$. Ainsi, $\ell' = L - \ell$ et $L' = \ell$.



$$\frac{L'}{\ell'} = \frac{\ell}{L - \ell} = \frac{1}{\frac{L}{\ell} - 1} = \frac{1}{\varphi - 1}.$$

Or $\frac{L'}{\ell'} = \varphi$, d'où $\varphi = \frac{1}{\varphi - 1}$ ie $\varphi(\varphi - 1) = 1$.

On en déduit que : $\boxed{\varphi^2 - \varphi - 1 = 0}$.

2°) Le trinôme $X^2 - X - 1$ admet pour discriminant $\Delta = 1 + 4 = 5$.

Ses racines sont : $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. Or $\varphi > 0$ et $\frac{1 - \sqrt{5}}{2} < 0$ donc $\boxed{\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}}$.

Partie 2 : Une suite convergente vers φ

3°) a) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, H_n : le réel u_n existe, $u_n > 0$ et $u_n \in \mathbb{Q}$.

★ H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.

$u_n > 0$ donc $u_n \neq 0$ donc u_{n+1} existe.

$u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} > 0$ comme somme de deux réels strictement positifs.

De plus, $u_n \in \mathbb{Q}$ donc $\frac{1}{u_n} \in \mathbb{Q}$ d'où $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} \in \mathbb{Q}$.

(L'ensemble \mathbb{Q} est stable par passage à l'inverse et pour la loi +).

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n \text{ existe, } u_n > 0 \text{ et } u_n \in \mathbb{Q}}$.

b) Calcul de u_1, u_2, u_3, u_4, u_5 :

$$u_1 = 1 + \frac{1}{u_0} = 1 + \frac{1}{1} = 2 \quad u_2 = 1 + \frac{1}{u_1} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \quad u_3 = 1 + \frac{1}{u_2} = \frac{5}{3}$$

$$u_4 = 1 + \frac{1}{u_3} = \frac{8}{5} \quad u_5 = 1 + \frac{1}{u_4} = \frac{13}{8}$$

On a : $\boxed{u_1 = 2, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{5}{3}, u_4 = \frac{8}{5}, u_5 = \frac{13}{8}}$.

Remarque : on a les écritures « étagées » :

$$u_1 = 1 + \frac{1}{1} \quad u_2 = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}} \quad u_3 = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1}}} \text{ etc...}$$

4°) f est dérivable sur \mathbb{R}_+^* comme somme de fonctions dérivables.

Pour tout $x > 0$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$.

f est strictement décroissante sur l'intervalle \mathbb{R}_+^* .

5°) Soit $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = u_{2n+2} = f(u_{2n+1}) = f(f(u_{2n})) = f \circ f(v_n)$ donc $v_{n+1} = f \circ f(v_n)$.

6°) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $H_n : v_n \leq v_{n+1} \leq \varphi$.

★ $u_0 = 1$ et $u_2 = \frac{3}{2}$. On a bien $v_0 \leq v_1$.

De plus, $\varphi - v_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} - \frac{3}{2} = \frac{\sqrt{5} - 2}{2}$. Comme $4 < 5$, $2 < \sqrt{5}$ donc $\varphi - v_1 \geq 0$.

Ainsi, H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.

$0 < v_n \leq v_{n+1} \leq \varphi$ et f est décroissante sur \mathbb{R}_+^* donc $f(v_n) \geq f(v_{n+1}) \geq f(\varphi)$.

En réutilisant la décroissance de $f : f(f(v_n)) \leq f(f(v_{n+1})) \leq f(f(\varphi))$.

Or $\varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$ donc $f(\varphi) = \varphi$ donc $f(f(\varphi)) = \varphi$.

Donc, en utilisant 5, $v_{n+1} \leq v_{n+2} \leq \varphi$.

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, H_n est vraie.

On a montré que la suite (v_n) est croissante et majorée par φ .

7°) La suite (v_n) est croissante et majorée donc la suite (v_n) converge vers un réel ℓ .

$\ell \geq v_0$ puisque la suite (v_n) est croissante. Ainsi $\ell > 0$.

Or on sait que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = (f \circ f)(v_n)$.

Comme $f \circ f$ est continue en ℓ (car $\ell \in \mathbb{R}_+^*$), d'après un théorème du cours, $\ell = f \circ f(\ell)$.

Ce qui s'écrit successivement :

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ell}} &= \ell \\ 1 + \frac{\ell}{\ell + 1} &= \ell \\ \frac{2\ell + 1}{\ell + 1} &= \ell \\ 2\ell + 1 &= \ell^2 + \ell \\ \ell^2 - \ell - 1 &= 0 \end{aligned}$$

Donc, puisque $\ell > 0$, $\ell = \varphi$ par le calcul fait en question 2.

Ainsi, la suite (v_n) i.e. la suite (u_{2n}) converge vers φ .

8°) $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{2n+1} = f(u_{2n})$.

(u_{2n}) converge vers φ et f est continue en φ donc $u_{2n+1} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(\varphi)$.

Or $f(\varphi) = \varphi$ donc la suite (u_{2n+1}) converge vers φ .

9°) La suite des termes d'indices pairs de u et la suite des termes d'indices impairs de u convergent vers une même limite φ .

Ainsi la suite (u_n) converge vers φ .

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{2n} \leq \varphi$ par la question 6.

Donc, par décroissance de $f : f(u_{2n}) \geq f(\varphi)$.

Or $f(\varphi) = \varphi$ et $f(u_{2n}) = u_{2n+1}$ donc $u_{2n+1} \geq \varphi$.

Finalement, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{2n} \leq \varphi \leq u_{2n+1}$.

Partie 3 : Étude de deux suites d'entiers

10°) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : p_n \in \mathbb{N}^*, q_n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{p_n}{q_n}$.

★ H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.

p_n et q_n sont dans \mathbb{N}^* donc $p_{n+1} = p_n + q_n \in \mathbb{N}^*$ et $q_{n+1} = p_n \in \mathbb{N}^*$.

De plus, $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} = 1 + \frac{q_n}{p_n}$ par H_n .

Donc $u_{n+1} = \frac{p_n + q_n}{p_n} = \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}}$ par définition des suites p et q .

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, p_n \in \mathbb{N}^*, q_n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{p_n}{q_n}$.

11°) $\forall n \in \mathbb{N}, p_{n+1} - p_n = q_n$. Or $q_n \in \mathbb{N}^*$ par la question 10 donc $p_{n+1} - p_n > 0$.

Ainsi, la suite (p_n) est croissante.

$\forall n \in \mathbb{N}^*, q_{n+1} - q_n = p_n - p_{n-1} \geq 0$ par ce qui précède.

De plus, $q_1 - q_0 = p_0 - p_0 = 0$.

Ainsi, la suite (q_n) est croissante.

12°) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} q_{n+2} \geq 2q_n &\iff p_{n+1} \geq 2q_n \\ &\iff p_n + q_n \geq 2q_n \\ &\iff p_n \geq q_n \\ &\iff q_{n+1} \geq q_n \end{aligned}$$

Or la suite q est croissante donc $q_{n+1} \geq q_n$ d'où $q_{n+2} \geq 2q_n$.

On a montré : $\forall n \in \mathbb{N}, q_{n+2} \geq 2q_n$.

13°) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : \alpha_n \leq \frac{1}{2^n}$.

★ $\alpha_0 = \frac{1}{q_0 q_1} = 1 \leq \frac{1}{2^0}$ donc H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.

$$\alpha_{n+1} = \frac{1}{q_{n+1} q_{n+2}}.$$

Par la question précédente, $q_{n+2} \geq 2q_n$ et les termes sont strictement positifs par la question 10.

Donc $\frac{1}{q_{n+2}} \leq \frac{1}{2q_n}$. Comme $\frac{1}{q_{n+1}} > 0$, il vient : $\frac{1}{q_{n+1} q_{n+2}} \leq \frac{1}{2q_n q_{n+1}}$.

Ce qui s'écrit : $\alpha_{n+1} \leq \frac{\alpha_n}{2}$ donc, par H_n , $\alpha_{n+1} \leq \frac{1}{2^{n+1}}$.
Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, \alpha_n \leq \frac{1}{2^n}$.

14°) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1} = (-1)^n$.

★ $p_0 = q_0 = 1$ donc $p_1 = 2$ et $q_1 = 1$.

$p_1q_0 - p_0q_1 = 2 \times 1 - 1 \times 1 = 1 = (-1)^0$ donc H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.

$$\begin{aligned} p_{n+2}q_{n+1} - p_{n+1}q_{n+2} &= (p_{n+1} + q_{n+1})p_n - (p_n + q_n)p_{n+1} && \text{par définition des suites } p \text{ et } q \\ &= p_{n+1}p_n + q_{n+1}p_n - p_n p_{n+1} - p_{n+1}q_n \\ &= -(p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1}) \\ &= -(-1)^n && \text{par } H_n \\ &= (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1} = (-1)^n$.

15°) ★ On a vu, par la question 9, que : $\forall p \in \mathbb{N}, u_{2p} \leq \varphi$ et $\forall p \in \mathbb{N}, \varphi \leq u_{2p+1}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$.

• Si n est pair, il s'écrit $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$, donc, d'après ci-dessus : $u_n \leq \varphi \leq u_{n+1}$.

Donc $0 \leq \varphi - u_n \leq u_{n+1} - u_n$.

On en tire que $|u_n - \varphi| = \varphi - u_n$, que $|u_{n+1} - u_n| = u_{n+1} - u_n$ et que $|u_n - \varphi| \leq |u_{n+1} - u_n|$.

• Si n est impair, il s'écrit $n = 2p + 1$ avec $p \in \mathbb{N}$.

D'après ci-dessus, $u_{2p+2} \leq \varphi$ et $\varphi \leq u_{2p+1}$, i.e. $u_{n+1} \leq \varphi \leq u_n$.

D'où $u_{n+1} - u_n \leq \varphi - u_n \leq 0$ puis $0 \leq u_n - \varphi \leq u_n - u_{n+1}$.

On en tire que $|u_n - \varphi| = u_n - \varphi$, que $|u_{n+1} - u_n| = u_n - u_{n+1}$ et que $|u_n - \varphi| \leq |u_{n+1} - u_n|$.

Finalement, dans les deux cas, $|u_n - \varphi| \leq |u_{n+1} - u_n|$.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$. $u_{n+1} - u_n = \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{p_{n+1}q_n - p_nq_{n+1}}{q_nq_{n+1}} = \frac{(-1)^n}{q_nq_{n+1}}$ par la question 14.

Comme la suite q est strictement positive, on en tire $|u_{n+1} - u_n| = \frac{1}{q_nq_{n+1}} = \alpha_n$.

Par la question 13, $\alpha_n \leq \frac{1}{2^n}$ donc $|u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{2^n}$.

★ On a montré : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \varphi| \leq |u_{n+1} - u_n| \leq \frac{1}{2^n}$.

16°) Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $u_n \in \mathbb{Q}$; cherchons à avoir $|u_n - \varphi| \leq 10^{-2}$.

Comme $|u_n - \varphi| \leq \frac{1}{2^n}$, il suffit que $\frac{1}{2^n} \leq 10^{-2}$, i.e. que $100 \leq 2^n$ (puisque $2^n > 0$ et $100 > 0$).

Comme $2^7 = 128 > 100$, $n = 7$ convient. Calculons $u_7 = \frac{p_7}{q_7}$ à l'aide d'un tableau :

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| p_n | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 |
| q_n | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 21 |

Ainsi, $u_7 = \frac{34}{21}$ est une approximation rationnelle de φ à 10^{-2} près.